



אל תאפשרו לוירוס RSV לקטוע את התוכניות שלכם

RSV, וירוס סינסיטיאלי נשימתי, הוא וירוס נפוץ ומדבק ויכול לגרום לזיהומים חמורים שעלולים להוביל לאשפוז אצל מבוגרים בגילאי 60+ ומבוגרים עם מחלות רקע כגון:^{1,5,6}



COPD
אסטמה



אי ספיקת
לב כרונית



אי ספיקת
כליות כרונית



סוכרת

אל תאפשרו לוירוס RSV לקטוע את התוכניות שלכם

למידע נוסף על RSV



פנו אל הרופא.ה המטפל.ת

COPD = מחלת ריאות חסימתית כרונית; RSV = וירוס סינסיטיאלי נשימתי

References:

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2023. RSV in older adults and adults with chronic medical conditions.
- Mesa-Frias M, Rossi C, Emond B, et al. Incidence and economic burden of respiratory syncytial virus among adults in the United States: a retrospective analysis using 2 insurance claims databases. J Manag Care Spec Pharm. 2022;28(7):753-765. doi:10.18553/jmcp.2022.21459.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2023. RSV Transmission.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2023. RSV Symptoms and care.
- Branche AR, et al. Clin Infect Dis 2022;74(6):1004-1011.
- Wyffels V, et al. Adv Ther 2020;37:1203-1217.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2023. RSV Prevention.

Important GSK Information

Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies.
GlaxoSmithKline 25 Basel street, P.O. Box 3345, Petach-Tikva 4951038 Israel, Tel: 03-9297100.
Medical information service: il.medinfo@gsk.com
Adverse events reporting service: il.safety@gsk.com, Tel: 03-929710
NP-IL-RSA-LBND-240001



מוגש כשירות לציבור מטעם GSK

RSV, וירוס סינסיטיאלי נשימתי, הוא וירוס נפוץ ומדבק²

אופן ההדבקה

- כמו עם זיהומים אחרים בדרכי הנשימה, שיעול או עיטוש יכולים בקלות להפיץ RSV³.
- אנשים שנדבקו ב-RSV מדביקים בדרך כלל במשך 3 עד 8 ימים³.
- חלק מהמבוגרים, עם מערכת חיסונית מוחלשת, עלולים להמשיך להעביר את הנגיף עד חודש, גם אם הם כבר ללא תסמינים³.
- ניתן להידבק ב-RSV מספר פעמים במהלך החיים³.

תסמינים של RSV

עשויים להיות⁴:



התסמינים של זיהום RSV יכולים לנוע בין הצטננות לתוצאות חמורות יותר שעלולות להימשך יותר משבועיים⁴.



מתכננים מסיבה?
אל תאפשרו לוירוס RSV
לקטוע את התוכניות שלכם

RSV ומחלות רקע

RSV עלול להשפיע באופן שלילי על החיים שלך, בעיקר אם יש לך מחלות רקע כגון COPD, אסתמה, אי ספיקת לב, מחלת לב כלילית, מחלת כליות כרונית, או סוכרת¹.
זיהומים ב-RSV עלולים אפילו להוביל לאשפוז^{5*}.

COPD
~3.5x -I ~13.4x
סיכון מוגבר לאשפוז (≤ גיל 65)⁵



אסתמה
~2.3x -I ~2.5x
סיכון מוגבר לאשפוז (≤ גיל 65)⁵



אי ספיקת לב
~4x -I ~7.6x
סיכון מוגבר לאשפוז (≤ גיל 60)⁵



מחלת לב כלילית
~3.8x -I ~6.5x
סיכון מוגבר לאשפוז (≤ גיל 65)⁵



מחלת כליות כרונית
מנבא משמעותי לאשפוז
(≤ גיל 65)⁶



סוכרת
~2.4x -I ~6.4x
סיכון מוגבר לאשפוז (≤ גיל 65)⁵



*מחקר מעקב פרוספקטיבי, מבוסס אוכלוסייה, בוצע כדי להעריך את היארעות האשפוז של RSV בקרב מבוגרים ≥18 שנים בסך הכל ואלה עם תחלואה נלווית ספציפית. מעקב אקטיבי ופסיבי זיהה 1099 מבוגרים שאושפזו עם RSV בשני אזורים גיאוגרפיים בארצות הברית (רוצ'סטר וניו יורק) במשך 3 עונות RSV. שיעורי ההיארעות שהוצגו לעיל אינם טווח, אלא תצפיות משני מוקדים שונים המורכבים מאזור המעקב. שיעורי ההיארעות המשווערים של כל מחלות הרקע עלו עם הגיל⁵.

כיצד ניתן למנוע RSV?

הנה כמה צעדים שתוכלו לנקוט על מנת להגן על עצמכם ועל אחרים מפני RSV⁷:

- לשטוף את הידיים
- להימנע מלגעת בפנים
- להימנע ממגע קרוב עם אנשים חולים
- יש לכסות את האף/הפה במקרה של עיטוש/שיעול
- ניקוי משטחים עתירי מגע
- להישאר בבית בזמן המחלה

